

17.

Beweis eines Ausdruckes, von welchem die Binomial-Formel ein einzelner Fall ist,

(Von Herrn N. H. Abel.)

Der Ausdruck ist folgender:

$$(x + \alpha)^n = x^n + \frac{n}{1} \alpha \cdot (x + \beta)^{n-1} + \frac{n \cdot n-1}{1 \cdot 2} \alpha (\alpha - 2\beta) (x + 2\beta)^{n-2} \dots \dots \dots$$

$$+ \frac{n \cdot n-1 \dots \dots \dots (n-\mu+1)}{1 \cdot 2 \dots \dots \dots \mu} \alpha (\alpha - \mu\beta)^{\mu-1} (x + \mu\beta)^{n-\mu}$$

$$+ \frac{n}{1} \alpha (\alpha - (n-1)\beta)^{n-2} (x + (n-1)\beta) + \alpha (\alpha - n\beta)^{n-1}.$$

x , α und β sind beliebige Größen, n ist eine ganze positive Zahl.

Wenn $n = 0$: so giebt der Ausdruck

$$(x + \alpha)^0 = x^0;$$

wie gehörig, Nun kann man, wie folgt, beweisen, daß der Ausdruck, wenn er für $n = m$ Statt findet, auch für $n = m + 1$, also allgemein, gilt.

Es sei

$$(x + \alpha)^m = x^m + \frac{m}{1} \alpha (x + \beta)^{m-1} + \frac{m \cdot m-1}{1 \cdot 2} \alpha (\alpha - 2\beta) (x + 2\beta)^{m-2} \dots \dots \dots$$

$$+ \frac{m}{1} \alpha (\alpha - (m+1)\beta)^{m-2} (x + (m-1)\beta) + \alpha (\alpha - m\beta)^{m-1}.$$

Man multiplicire mit $(m + 1)dx$ und integrire, so findet man:

$$(x + \alpha)^{m+1} = x^{m+1} + \frac{m+1}{1} \alpha (x + \beta)^m + \frac{(m+1)m}{1 \cdot 2} \alpha (\alpha - 2\beta) (x + 2\beta)^{m-1} \dots \dots$$

$$\dots \dots + \frac{m+1}{2} \alpha (\alpha - m\beta)^{m-1} (x + m\beta) + C,$$

wo C die willkürliche Constante ist. Um ihren Werth zu finden, sei

$$x = (m + 1) \beta,$$

so geben die beiden letzten Gleichungen:

$$(\alpha - (m+1)\beta)^m = (-1)^m \left[(m+1)^m \beta^m - m^m \alpha \beta^{m-1} + \frac{m}{2} (m-1)^{m-1} \alpha (\alpha - 2\beta) \beta^{m-2} \right. \\ \left. - \frac{m \cdot m-1}{2 \cdot 3} \alpha (\alpha - 3\beta)^2 (m-2)^{m-2} \beta^{m-3} \dots \dots \dots \right],$$

$$(\alpha - (m+1)\beta)^{m+1} = (-1)^{m+1} \left[(m+1)^{m+1} \beta^{m+1} - (m+1)m^m \alpha \beta^m \right. \\ \left. + \frac{(m+1)m}{2} (m-1)^{m-1} \alpha (\alpha - 2\beta) \beta^{m-1} \dots \dots \dots \right] + C.$$

Multiplicirt man die erste Gleichung mit $(m+1)\beta$, und thut das Product zur zweiten, so findet man:

$$C = (\alpha - (m+1)\beta)^{m+1} + (m+1)\beta (\alpha - (m+1)\beta)^m, \text{ oder}$$

$$C = \alpha (\alpha - (m+1)\beta)^m.$$

Daraus folgt, dafs der zu beweisende Ausdruck auch für $n = m + 1$ Statt findet. Er gilt aber für $n = 0$; also gilt er auch für $n = 0, 1, 2, 3$ etc., das heifst: für jeden beliebigen ganzzahligen und positiven Werth von n .

Setzt man $\beta = 0$, so bekommt man die Binominal-Formel.

Setzt man $\alpha = -x$, so findet man:

$$0 = x^n - \frac{n}{1} x (x + \beta)^{n-1} + \frac{n \cdot n-1}{2} x (x + 2\beta)^{n-2} \\ - \frac{n \cdot (n-1) (n-2)}{2 \cdot 3} x (x + 3\beta)^{n-3} \dots \dots \dots,$$

oder, wenn man mit x dividirt,

$$0 = x^{n-1} - \frac{n}{1} (x + \beta)^{n-1} + \frac{n \cdot n-1}{2} (x + 2\beta)^{n-2} \\ - \frac{n \cdot (n-1) (n-2)}{2 \cdot 3} (x + 3\beta)^{n-3} \dots \dots \dots,$$

wie auch sonst schon bekannt ist; denn das zweite Glied dieser Gleichung ist nichts anderes, als

$$(-1)^{n-1} \Delta^n (x^{n-1}),$$

wenn man die constante Differenz gleich β setzt.